

Everything you need to know about

High Temperature

For more information or an Appointment Please call 1826666 Ext. 2328



















High Temperature (Fever)

Fever is when the body temperature rises above 38 C. It is a sign of infection in the body – this is often due to a virus but sometimes by bacteria. Viral infections are far more common and do not need antibiotics.

A high fever does not necessarily mean your child has a serious illness. Fever means your child's body is fighting the infection, and their temperature will return to normal when the infection is gone.

Care at home

- Do not overdress your child; put them in enough clothing so they are not shivering
- Give them frequent small drinks
- Don't worry if they don't want to eat
- Tepid sponging is recommended

Paracetamol

- · Give this if your child has fever
- Follow the instructions on the bottle
- Only give 4 doses in 24 hours

Ibuprofen

- This can be given instead of panadol if you find panadol is not working
- Follow the instructions on the bottle

Call for help

If your child has a fever and any of the following symptoms:

- Rash
- Vomiting
- Headaches, stiff neck, or complaining of light hurting their eyes
- Convulsions, fits
- More sleepy than usual
- Breathing problems
- If any other troubling symptoms appear
- You must also see a doctor if your child is under
 3 months of age and his/her temperature is over 40^C
- Or you are worried in any way

When to bring your child back

- If they look more sick than before
- They did not improve within 48 hours

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

الحمى هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من ٣٨ درجة مئوية ، و يكون ذلك دلياً على وجود عدوى في أي جزء من الجسم - و غالبًا ما يكون ذلك يفعل أحد الفيروسات (التهاب فيروسي) ، بيد أنه في بعض الأحيان بعدث ذلك بفعل أحد أنواع البكتريا (التهاب بكتيري) .

الالتهابات الفيروسية هي الأكثر شيوعًا إلى حد كبير، و لا تحتاج في علاجها إلى تعاطى مضاد حيوى .

الارتفاع الشديد في درجة الحرارة لا يعني بالضرورة أن الطفل يعاني من مرض خطيس في حقيقة الأمر ؛ حيث إن الحمى مفادها أن جسم الطفل يصارع العدوى ، و سوف تعود درجة حرارته إلى معدلها الطبيعي بعد انتهاء العدوى .

أسس الرعاية المنزلية:

- تحظر المبالغة في إلباس الطفل ملابس ثقيلة، بل يُفضل إلباسهم ملابس مناسبة بما يكفى لتفادى شعورهم بالرعشة.
 - منحهم كميات صغيرة من السوائل بصورة متكررة .
 - عدم الشعور بالقلق في حالة فقدانهم الرغبة في تناول الطعام .
 - يوصى باستخدام الكمادات الفاترة.

بانادول:

- يُنصح بمنح الطفل هذه النوعية من العقاقير الطبية في حالة إصابة طفلك بأعراض الحمى.
 - إتباع التعليمات المرافقة لزجاجة الدواء .
- · يُنصح بعدم تجاوز أربع (٤) جرعات كل أربع و عشرين (٢٤) ساعة .


العلاج بمادة إيبوبروفين:

- يُنصح بمنح الطفل هذه النوعية من العقاقير الطبية بدلاً من نظيراتها
 التي يدخل في تركيبها مادة باراسيتامول في حالة عدم نجاحها.
 - إتباع التعليمات المرافقة لزجاجة الدواء .

متى يتعين طلب المساعدة

في حالة إصابة طفلك بأعراض الحمى، مع وجود أي من الأعراض . الأتبة:

- طفح جلدي.
 - قىء.
- صداع ، أو تصلب بالرقبة ، أو الشكوى من عدم قدرة العينين على تحمل الضوء.
 - نوبة تشنجات.
 - الرغبة المفرطة في النعاس على نحو مخالف لما هو معتاد.
 - مشاكل في التنفس.
 - أو بخلاف ذلك في حالة وجود أي أعراض تثير القلق أو المخاوف.
- يتوجب أيضًا مراجعة الطبيب في حالات الأطفال الذين تقل أعمارهم
 عن ثلاثة (۲) أشهر ، مع إصابتهم بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة لما
 فوق ٤٠ درجة مئوية .
 - متى تتوجب معاودة الطبيب مجددًا ؟
 - في حالة اشتداد حدة المرض عليهم أكثر من ذي قبل.
- في حالـة عـدم حـدوث تحسـن فـي حالتهـم المرضيـة في غضـون ٤٨ ساعة .



کل ماترید آن تعرفه عن

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

للإستفسار وحجــز المواعـيــد يرجى الإتصال على 6666 182 داخلـي 2328

















