




مستشفى المواساة الجديد  
NEW MOWASAT HOSPITAL

كل ما تحتاج معرفته عن

## فيروس الروتا

للإستفسار وحجز المواعيد  
يرجى الإتصال 182 6666



نرعى الأجيال  
CARING FOR GENERATIONS

☎ (965) 182 6666 @newmowasathospital new mowasat hospital www.newmowasat.com  
📱 (965) 5082 6666 @nmowasat new mowasat hospital 📱 App Store 📱 Google play myMowasat

### ما هي عدوى فيروس روتا؟

فيروس روتا هو أحد الأسباب الرئيسية لكل من:

- الإسهال الشديد المائي
- القيء
- ألم البطن
- إرتفاع في درجة الحرارة
- العوارض التالية في الرضع والأطفال الصغار من 5 سنوات
- يمكن لأعراض الفيروس أن تستمر لمدة تصل 8 أيام
- يمكن للإسهال الشديد والقيء المتكرر أن يؤديا بسرعة للجفاف في الطفل المصاب بالعدوى
- فيروس روتا مسؤول عن نسبة 40% من حالات إدخال الأطفال للمستشفى بسبب الإسهال والقيء

### كيف ينقل فيروس روتا؟

فيروس روتا فيروس مُعددي للغاية وينتقل بصفة رئيسية عن طريق الفم

- يمكن للفيروس كذلك أن يعيش خارج جسم الإنسان لأسابيع، لذلك يمكن أن يتواجد على:
- اليدين
- أشياء الطفل ولعبه، كخشيشة الطفل

### أسطح تغيير الحفاضات


- حتى مراعاة قواعد النظافة وجودة المياه في المنزل لا يمكنها أن تقي بفاعلية من فيروس الروتا.
- أظهرت بعض الدراسات مؤخرًا أن الفيروس يمكنه الانتشار عبر القطيرات الهوائية وهو ما يسهل من انتشار العدوى

### من الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس روتا؟

- جميع الأطفال يصابون بعدوى الفيروس لمرة واحدة على الأقل قبل أن يبلغوا الخامسة من العمر
- الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 24 شهرًا معرضون بدرجة أكبر لخطر المعاناة من عدوى فيروس روتا ومضاعفاته التي قد تؤدي للوفاة
- تقتل عدوى فيروس روتا طفلًا كل دقيقة

### كيف يمكن وقاية الأطفال من العدوى؟

- يعتبر التطعيم هو الوسيلة المثلى لمنع الإسهال والقيء الشديد
- الوقاية المبكرة من فيروس الروتا أمر ضروري حيث أن الأطفال
- الصغار هم الأكثر عرضة للمعاناة من العدوى الشديدة
- يعطى لقاح الفيروس عن طريق الفم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 شهور





مستشفى المواساة الجديد  
NEW MOWASAT HOSPITAL

## Everything you need to know about

# Rotavirus infection

### For Appointment

Please call 1826666



نرعى الأجيال  
CARING FOR GENERATIONS



(965) 1 82 6666 @newmowasathospital new mowasat hospital www.newmowasat.com  
(965) 5082 6666 @nmowasat new mowasat hospital AppStore Google play myMowasat

### What is Rotavirus infection?

- Rotavirus is leading cause of
- Severe Diarrhea
- Vomiting
- Abdominal Pain
- In babies and young children under 5 years old
- Rotavirus symptoms can last up to 8 days
- Severe diarrhea and frequent vomiting can rapidly lead to dehydration of the infected child
- Rotavirus is responsible for 40% of childhood hospitalization due to diarrhea and vomiting

### How is Rotavirus transmitted?

Rotavirus is highly infectious virus and it is mainly transmitted through the oral route.

**Rotavirus can also live outside the human body for weeks and may be found on:**

- One's hands
- Baby objects and toys, like a baby rattle.



- Diaper-changing surfaces.
- Even good home hygiene, sanitation and water quality cannot effectively prevent Rotavirus.
- Some recent studies have showed that the virus can spread through air droplets, which make the spread of the infection easier

### Who is at risk of getting infected with Rotavirus?

- All children get infected with Rotavirus at least once before they reach 5 years of age.
- Babies between 6-24 months of age are at higher risk of suffering from rotavirus infection and complications that may even lead to death.
- Rotavirus infection kills the child every minute

### How can children be protected from Rotavirus infection?

- Vaccination is considered to be the best way to prevent severe diarrhea and vomiting due to Rotavirus.
- Early Protection against Rotavirus is necessary as young babies are most likely to suffer from severe infection.
- The Rotavirus vaccine is given by mouth to children younger than 6 months of age.

