



مستشفى المواصة الجديد  
NEW MOWASAT HOSPITAL

# كل ما تحتاج معرفته عن تسوس أسنان الرضع بسبب زجاجة الرضاعة

للإستفسار وحجز المواعيد  
يرجى الإتصال 182 6666 داخلي 2120



نرعى الأجيال  
CARING FOR GENERATIONS

(965) 1 82 6666

@newmowasathospital

new mowasat hospital

www.newmowasat.com

(965) 5082 6666

@nmowasat

new mowasat hospital

Download on the  
App Store

Download from  
Google play

myMowasat

## تسوس أسنان الرضع بسبب زجاجة الرضاعة

تسوس الأسنان لدى الرضع والأطفال صغار السن غالباً ما يشار إلى أن تسوس أسنان الرضع يرجع إلى الرضاعة من زجاجة الرضاعة

## الأطفال ذوي تسوس الأسنان بسبب زجاجة الرضاعة يجب فحصهم وعلاجهم

### الأسباب:

- يحدث التسوس عندما يصاب الفم بعدوى البكتيريا المنتجة للحمض
- يمكن أن تنتقل البكتيريا للآباء ومسئول الرعاية الطبية عن طريق تبادل سائل اللعاب على الملعقة أو الكوب عند تذوق الأطعمة قبل إطعام الأطفال
- ويحدث ذلك أيضاً عند قيام الرضع بوضع القنينة الممتلئة لسوائل المحلاة أو الحليب أو العصائر لفترات زمنية طويلة
- يمكن أن يحدث التسوس عند وضع الأطفال في الفراش مع قنينة الحليب أو العصير أو المياه المحلى أو المشروبات المحلاة أثناء النوم

### علامات الدالة على تسوس أسنان الرضع بسبب زجاجة الرضاعة هي:

- بقع بيضاء على اللثة العلوية

### كيفية منع تسوس الأسنان:

- القيام بنظافة الفم جيداً في مراحل العمر المبكر
- يجب مسح لثة الأطفال ضمادة (قطعة) شاش نظيفة
- لبدء في تفريش أسنان أطفالكم عند ظهور أول سنة. عند استخدام معجون أسنان يتم استخدامه بدون فلورايد
- يتم تنظيف وتديل اللثة في الأماكن الخالية من الأسنان
- استخدام خيط الأسنان عند نمو وظهور جميع الأسنان من اللثة
- يتم تفريش أسنان أطفالكم مرتين يومياً (قبل الإفطار وقبل النوم)
- لا يجب وضع الطفل في الفراش مع زجاجة الرضاعة الممتلئاً بالحليب، العصير أو الطعام
- لا تستخدموا زجاجة الرضاعة أو الكوب بالشفاطة كوسيلة لتهدئة الأطفال
- علموا أطفالكم أن يشربوا من أكواب عادية بقدر المستطاع
- يتم تقليل كمية الحلويات أو الأطعمة اللزجة التي قد يتناولها الأطفال
- يتم زيارة أطباء أسنان الأطفال عند شعور الآباء بأي قلق على أسنان أطفالهم

يجب الانتباه إلى أن أسنان الطفل اللبنية الصحية تؤدي إلى أسنان الأطفال الدائمة تكون صحية أيضاً

## **Baby Bottle Tooth Decay**

Tooth decay in infants and very young children is often referred to as Baby bottle tooth decay

### ***A child with tooth decay needs to be examined and treated***

#### **Causes:**

- It develops when the baby's mouth is infected by acid producing bacteria
- Parents and care givers can pass bacteria by sharing saliva on the spoon or cups when testing food before feeding children
- It happens also when sweetened liquids or milk, milk formula, fruit juice cling to an infant's teeth for a long time
- It can occur when babies are put to bed with a bottle of milk or juice, sugar water or sugared drink while they are asleep

#### **Signs of Baby Bottle Tooth Decay:**

- White spots at the gum line on the upper teeth

#### **How to prevent the tooth decay**

- Implementing good oral hygiene at an early stage
- Wipe the babies gum with a clean gauze pad or wash cloths after each feed
- Begin brushing your child's teeth when the first teeth appear. If you choose toothpaste, use one without fluoride
- Clean and massage gums in areas without teeth
- Floss the mouth when all the baby teeth are exposed on the gums
- Brush your child's teeth twice daily (before breakfast and before bed time)
- Never put your child to bed with a bottle of milk, juice or food
- Do not use a bottle or Sippy cup as a pacifier
- Teach your child to drink from a regular cup as soon as possible
- Limit the amount of sweet or sticky foods to your child
- Visit a Pediatric dentist if you feel any concern about your child's teeth

**REMEMBER THAT HEALTHY BABY TEETH WILL LEAD TO HEALTHY PERMANENT TEETH**



مستشفى المواساة الجديد  
NEW MOWASAT HOSPITAL

Everything you need  
to know about

## BABY BOTTLE TOOTH DECAY

For Appointment

Please call 1826666 Ext. 2120



نرعى الأجيال  
CARING FOR GENERATIONS



(965) 1 82 6666

@newmowasathospital

new mowasat hospital

www.newmowasat.com

(965) 5082 6666

@nmowasat

new mowasat hospital

Download on the  
App Store

Download from  
Google play

myMowasat